



Svjetski dan sepse – 13 rujan Jedan dan-Jedna vizija-cjelogodišnji trud

UOČITE SEPSU U ODRASLIH

Sepsa je definirana kao po život opasna disfunkcija organa uzrokovana neadekvatnim odgovorom domaćina na infekciju.

Razmotrite mogućnost sepse kod svakog odraslog pacijenta tko ima suspektu ili potvrđenu infekciju i koji se doima loše, uključujući pacijente sa SARS-Cov-2. Rani upozoravajući znakovi mogu biti korisni u identifikaciji lošijih pacijenta.

Standardna definicija sepse bazirana je na ocjeni sekvencijalne procjene zatajenja organa (SOFA). SOFA varijable:

- PaO₂/FiO₂ omjer
- Bilirubin
- Razina trombocita
- Primjena vazopresora i učestalost doziranja
- Serum Kreatinina ili količina urina
- Srednji arterijski tlak (MAP)
- Glasgow koma skala (GCS)

SOFA SCORE ≥ 2 u okruženju infekcije snažno podržava dijagnozu sepse

SEPTIC SHOCK: Vazopresori moraju održavati MAP ≥ 65 mmHg i razinu laktata u serumu ≥ 2 mmol/L (18 mg/dL) bez obzira na volumnu nadoknadu

Reagirajte brzo kada postoji sumnja na sepsu. Mortalitet raste svakim satom.



Global
Sepsis
Alliance



Svjetski dan sepse – 13 rujan Jedan dan-Jedna vizija-cjelogodišnji trud

Liječite odrasle oboljele od sepse kao hitno stanje – **UNUTAR 1 SATA**

- Mjerite razinu laktata, ponovite mjerenje ako je inicijalna razina laktata ≥ 2 mmol/L
- Uzmite uzorak krvi za hemokulturu prije davanja antibiotika
- Primjenite antibiotike širokog spectra
- Započnite brzu primjenu 20 mL/kg kristaloida za hipotenziju ili kod razine laktata ≥ 4 mmol/L
- Intervencija na kontroli uzroka – čim je moguća

Ako šok ne reagira na boluse tekućine

- Započnite terapiju vazopresorima –cilj MAP ≥ 65 mmHg
- Norepinefrin je prvi izbor za vazopresore
- Vazopresin ili epinefrin može biti dodan ako norepinefrin ne dosegne ciljani srednji arterijski tlak

Ako šok ne reagira na vazopresore, započnite preseljenje u ustanovu sa iskustvom u tretiranju septičkog šoka.

Reagirajte brzo kada postoji sumnja na sepsu. Mortalitet raste svakim satom.



Global
Sepsis
Alliance