



## Día Mundial de la Sepsis - Septiembre 13

Un día - Una visión - Todo el año de esfuerzos

### DETECTE LA SEPSIS MATERNA

Sepsis se define como la disfunción orgánica potencialmente mortal causada por la respuesta desproporcionada a una infección.

Considere sepsis si una mujer que está embarazada o en los 14 días post-parto, con sospecha o diagnóstico confirmado de una infección se observa en mal estado. Las escalas de alerta temprana pueden ser útiles para identificar a pacientes delicadas, incl. pacientes con SARS-CoV-2.

La definición estándar de sepsis se basa en el puntaje SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), sus variables son:

- Relación  $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$
- Bilirrubina
- Conteo plaquetario
- Administración y dosis de vasopresores
- Creatinina sérica y gasto urinario
- Presión arterial media (PAM)
- Escala de coma de Glasgow (ECG)

**PUNTAJE DE SOFA**  $\geq 2$  en presencia de una infección sugiere el diagnóstico de sepsis.

**CHOQUE SÉPTICO:** requerimiento de vasopresores necesarios para mantener  $\text{PAM} \geq 65$  mm Hg y lactato en sangre  $\geq 2$  mmol/L (18 mg/dL) después de una reanimación hídrica.

Actúe rápido cuando sospeche de sepsis.  
La mortalidad incrementa cada hora.



Global  
Sepsis  
Alliance



## Día Mundial de la Sepsis - Septiembre 13

Un día - Una visión - Todo el año de esfuerzos

### TRATE LA SEPSIS MATERNA COMO UNA EMERGENCIA - **EN LA PRIMERA HORA**

- Mida niveles de lactato, y vuelva a medir si el lactato inicial es  $\geq 2$  mmol/L en sangre
- Obtenga cultivos de sangre antes de administrar antibióticos
- Administre antibióticos de amplio espectro
- Inicie la administración rápida de 20 mL/kg de solución cristaloide isotópica para tratar de corregir la hipotensión o si el lactato en sangre es  $\geq 4$  mmol/L
- Realice las intervenciones necesarias para controlar la causa *lo más pronto posible*

#### **SI EL CHOQUE ES REFRACTARIO A LA REANIMACIÓN HÍDRICA**

- Inicie terapia con vasopresores - PAM objetivo  $\geq 65$  mm Hg
- Norepinefrina como vasopresor de primera elección
- Vasopresina o epinefrina pueden ser añadidos si la norepinefrina falla como único vasopresor para alcanzar los niveles de PAM deseados

#### **SI EL CHOQUE ES REFRACTARIO A VASOPRESORES, POR FAVOR, INICIE LA REFERENCIA A UN HOSPITAL QUE TENGA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO.**

Actúe rápido cuando sospeche de sepsis.  
La mortalidad incrementa cada hora.



Global  
Sepsis  
Alliance